

# 四價預防流感疫苗

## 簡介

2022/23年度

四價流感疫苗可預防的四種流感病毒包括:

- 類甲型 A/維多利亞Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09病毒
- 類甲型 A/達爾文Darwin/9/2021(H3N2)病毒
- 類乙型 B/奧地利Austria/1359417/20212021(B/維多利亞Victoria lineage)病毒
- 類乙型 B/布吉 Phuket/3073/2013 病毒

## 疫苗有沒有副作用？

接受預防流感疫苗是**非常安全**的。

常見的注射後反應包括接種疫苗後6-12小時內，出現輕微發熱，流鼻水，肌肉疼痛或疲倦等短暫徵狀，這些徵狀一般會在注射後二至三天內減退。

其他副作用如：

- 格林-巴利氏綜合症-約100萬分之一或二的機會
- 腦膜炎或腦病變-300萬分之一的機會
- 嚴重過敏反應-1,000萬分之九的機會

## 誰人適合接受流感疫苗？

滿6個月以上人士已經可以接受流感疫苗，而疫苗尤其適合：

- 孕婦、
- 6個月至未滿12歲兒童、
- 有長期健康問題人士/有慢性疾病人士、
- 50歲或以上人士、
- 居於殘疾人士院舍的長期宿友、
- 醫護人員、
- 需要經常與人接觸的人士 或
- 擔心於COVID 流行期間，因患上流感而受到兩重危害的人士



2022/23年度  
政府「流感疫苗資助」  
將於10月展開  
(確定日期有待衛生署公佈)

**疫苗資助計劃**  
Vaccination  
Subsidy  
Scheme

## 流感疫苗的注射劑量

### 9歲以下

過往從未接種過流感疫苗的小童，應接種兩劑流感疫苗，而兩劑疫苗的接種時間至少相隔4個星期，之後每年只要接種一針

### 9歲以上

不論曾經接種與否，每年只要接種一針

## 什麼人士不宜接受預防 流感疫苗？

**6個月以下嬰兒、對流感疫苗成份有過敏反應的人士，不宜接受預防流感疫苗**

在注射當日身體嚴重不適或有發熱症狀的人士(請延後注射時間)；曾經患有格林-巴利氏綜合症(Guillain-Barre Syndrome)的人士，請先向醫生諮詢。

此外，流感疫苗可同時/同日與COVID-19疫苗一起進行。



2022/23年度，

UCN(社康)外展將一律採用

四價(注射式)滅活流感疫苗-Fluarix Tetra

葛蘭素史克藥廠(GSK)(德國生產)

隨著COVID-19繼續流行，流感病毒與2019

冠狀病毒亦可能於今年冬季同時傳播，

接受流感疫苗注射可為你加強保護

外展團體注射：

我們除了供應優惠之四價流感疫苗注射外，同時歡迎合資格群組使用[疫苗資助計劃]免費接種流感疫苗

如有任何查詢，

歡迎致電 2357-4008 或電郵 [vaccine@ucn.org.hk](mailto:vaccine@ucn.org.hk)

與社區醫療外展部聯絡